



LE TERRORISME CHIMIQUE

Rédaction :
François Côté, Geneviève Smith
Division des sciences et de la technologie
Le 15 janvier 2002

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

L'UTILISATION DE L'ARME CHIMIQUE ET LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES

ACQUISITION D'AGENTS CHIMIQUES

MOYENS ET FACILITÉ DE PRODUCTION

VECTEURS DE DISSÉMINATION

AGENTS POTENTIELS

A. Tableau récapitulatif

B. Agents suffocants

C. Agents vésicants

D. Agents hémotoxiques

E. Agents neurotoxiques

HISTOIRE DE LA GUERRE CHIMIQUE

LE TERRORISME CHIMIQUE

INTRODUCTION

Les agents chimiques de guerre sont des substances qui, par leurs effets toxiques, peuvent tuer, blesser ou provoquer une incapacité. Sur les milliers de produits chimiques qui ont été utilisés ou stockés en tant qu'armes chimiques au XX^e siècle et les terroristes estiment qu'un petit nombre seulement de ces produits pourraient servir comme nombre de ces agents ont des utilisations civiles tout à fait légitimes, on peut se les procurer sans peine auprès de plusieurs sources, quand ils ne sont pas très faciles à fabriquer.

L'UTILISATION DE L'ARME CHIMIQUE ET LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES

Bien que l'histoire de l'arme chimique remonte à l'antiquité, sa première utilisation sur une grande échelle ne date que de la Première Guerre mondiale, où elle a fait passer l'indignation publique suscitée par l'emploi de ce type d'arme durant ce conflit allait entraîner, en 1925, la signature du Protocole de Genève interdisant l'utilisation militaire non leur production ni leur stockage⁽³⁾. Plusieurs pays, dont le Canada, ont signé le protocole, mais en précisant qu'ils ne le considéraient comme contraignant que lorsque la même donné son adhésion, et qu'il cesserait d'être contraignant par rapport à un pays ennemi qui n'en respecterait pas les dispositions⁽⁴⁾. Au cours des années qui ont suivi, l'arme chimique a été utilisée en Éthiopie par l'Italie (pourtant signataire du protocole), ainsi qu'en Mandchourie et en Chine par le Japon (alors non-signataire). De plus, les Alliés et les puissances neutres ont utilisé de grandes quantités d'agents chimiques durant la Seconde Guerre mondiale, mais rien ne prouve qu'ils en ont employé au cours de ce conflit⁽⁵⁾. La recherche sur l'arme chimique, tout au long de la Guerre froide, a permis d'améliorer considérablement son pouvoir vulnérant, et les stocks d'armes chimiques ont continué de croître partout dans le monde. Ils ont été utilisés à la fin des années 1980, au cours de la guerre entre l'Iran et l'Irak⁽⁶⁾. Toutefois, au fur et à mesure que le désarmement international recueillait un consensus, le contrôle des armes chimiques a gagné du terrain.

Après plusieurs décennies de négociation, la Convention sur les armes chimiques – un nouveau traité qui devait compléter le Protocole de Genève – était ouvert à la signature et le Canada a été parmi les premiers à le signer et il a adopté par la suite, en 1995, la *Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques*. La Convention interdit l'utilisation, la production, l'acquisition, le stockage et le transfert d'armes chimiques. Elle précise que les armes chimiques incluent non seulement les agents mais aussi toutes les munitions destinées à leur dispersion⁽⁷⁾. La Convention entend par produit chimique toxique « tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques, peut causer la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents ». Étant donné que les végétaux ne sont pas mentionnés dans cette définition, l'utilisation de l'agent Orange – n'est pas interdite. Les agents incendiaires comme le napalm ne sont pas, non plus, mentionnés parmi les produits interdits par la Convention, car leurs effets thermiques et non à leurs propriétés toxiques⁽⁸⁾. Bien qu'interdits à des fins militaires, les agents anti-émeutes – comme le gaz lacrymogène et le gaz poivré – peuvent être utilisés pour faire respecter la loi. En outre, les virus et les bactéries toxogènes ne sont pas visés par cette convention, mais sont interdits, en tant qu'armes, par la Convention sur les armes chimiques⁽⁹⁾.

ACQUISITION D'AGENTS CHIMIQUES

Plusieurs auteurs ont mentionné la facilité avec laquelle les organisations infranationales peuvent se procurer ou produire des armes chimiques, notamment :

- en les achetant à des fournisseurs industriels autorisés;

Le terrorisme chimique (PRB 01-2...

que le vol d'armes chimiques y est plus probable(14). Nombre de pays, dont certains signataires de la Convention sur les armes chimiques, conservent un important arsénal de sécurité des entrepôts varie considérablement à l'intérieur d'un pays et d'un pays à l'autre; même aux États-Unis, certaines de ces installations offrent, a-t-on dit, un degré de supermarchés(15). La sécurité est encore plus faible dans les centres de recherche médicaux et scientifiques, où l'on trouve des armes potentielles de même que leurs précurseurs.

Le Canada n'entrepose pas d'armes chimiques, si ce n'est celles servant au contrôle des foules et à la répression des émeutes(16). Cependant, le ministère de la Défense natic en permanence un certain stock d'agents chimiques pour ses recherches en défense chimique et biologique au Centre de recherches pour la défense Suffield. Les programmes de et d'instruction du MDN dans le domaine de la défense biologique et chimique font l'objet d'un examen annuel par le Comité d'examen de programme de défense biologique et c de s'assurer que les activités entreprises « ont un caractère défensif et qu'elles sont menées de façon professionnelle, sans menacer la sécurité de la population ni l'environnement rapport, le Comité conclut qu'il y a absence d'arrière-pensées dans le programme de protection chimique et biologique du gouvernement, et que rien ne prouve que des activités menées(18).

MOYENS ET FACILITÉ DE PRODUCTION

Les groupes terroristes peuvent aussi décider de produire leurs propres armes chimiques. Moyennant 10 à 14 millions de dollars US, il serait possible de se doter d'une in phosgène – un agent chimique relativement facile à produire – de taille raisonnable(19). Il est aussi relativement facile de fabriquer un agent neurotoxique, puisque les techniques à peu près les mêmes que celles utilisées pour la fabrication d'insecticides(20). Comme nous l'avons vu, plusieurs agents chimiques peuvent être fabriqués dans des installations inoffensives qui existent dans la plupart des pays(21). Nombre d'agents dangereux sont synthétisés à partir d'ingrédients qui peuvent avoir des applications commerciales. chimiques qui entrent dans la composition du sarin (un gaz neurotoxique) sont utilisés dans la fabrication des ignifugeants, des additifs pour l'essence, des plastifiants, des solvants antiseptiques(22).

Il suffirait à un groupe infranational désireux de produire ses propres armes chimiques de faire appel à une personne possédant des connaissances de 2^e ou de 3^e cycle en chimie. trouver la plupart des renseignements techniques nécessaires dans la littérature; par exemple, il est intéressant de noter que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont levé la fabrication du gaz neurotoxique VX, l'un des plus puissants agents neurotoxiques(24). Il est certes possible de synthétiser des agents comme le sarin et le VX dans un laboratoire rudimentaire, mais une telle entreprise ne serait pas sans risque pour la santé des préparateurs, ce qui risque de dissuader ceux qui seraient tentés de se lancer dans la production.

VECTEURS DE DISSÉMINATION

Si la production des armes chimiques peut poser des problèmes, leur dissémination en pose de plus grands encore.

Une bombe chimique explosant dans une aérogare très fréquentée tuerait sans doute des centaines de personnes; un avion d'épandage survolant à basse altitude un stade de football ferait des milliers de victimes; un générateur de fumée placé à l'arrière d'une camionnette qui sillonnerait les rues d'une ville porterait des dizaines de milliers de personnes par dissémination sous forme d'aérosol. Cependant, pour parvenir à porter des attaques d'une telle ampleur contre une ville, avec un degré de réussite modéré, il faudrait utiliser des dizaines de gallons d'agents chimiques et le faire dans des conditions environnementales même si elles ne sont pas idéales(26).

Une attaque terroriste à l'arme chimique peut se faire ouvertement ou secrètement. Il existe plusieurs façons de déployer une telle arme, par exemple les bombes, les sous-marins à têtes explosives et les réservoirs de solution à pulvériser(27). Plusieurs vecteurs permettent, par ailleurs, une diffusion clandestine, et les trois scénarios suivants retiennent (1) contamination des réseaux publics de distribution d'eau; (2) contamination d'aliments; (3) dispersion sous forme d'aérosols ou de vapeurs dans des espaces clos(28).

Le premier scénario a peu de chances d'aboutir pour plusieurs raisons. Certains agents – comme les pesticides organophosphatés – se décomposent dans l'eau, ce qui qu'armes(29). Les systèmes de filtration et de purification de la plupart des installations de traitement des eaux permettent aussi de réduire les risques de contamination. Quant aux volumes d'eau en cause, les produits chimiques seraient automatiquement très dilués, si bien qu'il faudrait en employer d'énormes quantités pour parvenir à distribution(30). Cependant, l'approvisionnement en eau d'installations individuelles se prêterait à de telles attaques. Dans ce genre de situation, la filtration et la dilution moindre à l'action terroriste(31).

Plusieurs cas de contamination de produits alimentaires par des agents chimiques ont été documentés. En voici quelques exemples :

- 1994 : 15 personnes meurent au Tadjikistan après avoir bu du champagne contenant du cyanure;
- 1989 : le Chili perd des millions de dollars en exportations quand les États-Unis découvrent que son raisin est contaminé au cyanure;
- 1981 : contamination à l'herbicide de produits alimentaires dans plusieurs épiceries britanniques;
- 1977-1989 : plusieurs cas de contamination et de menace de contamination des agrumes israéliens avec du mercure liquide.

La diffusion d'armes chimiques en aérosol permet d'utiliser des vecteurs non explosifs. Avec cette méthode, les espaces clos constituent des cibles idéales; la direction et la vitesse des observations météorologiques précises jouent alors un rôle très important dans la réussite de l'attaque. Jusqu'ici, la seule attaque terroriste où une arme chimique a été diffusée en aérosol dans un espace clos a été le fait de la secte Aum Shinriky qui, en 1995, a utilisé du sarin dans le métro de Tokyo. Alors qu'elle aurait dû faire des milliers de victimes, elle n'en a fait que 12 morts et une quarantaine de blessures graves. Le culte avait dépensé plus de 30 millions de dollars en recherche et en équipement, ce qui montre bien à quel point une attaque à l'arme chimique susceptible de faire un grand nombre de victimes(32).

AGENTS POTENTIELS

Les armes chimiques sont le plus souvent réparties en quatre groupes, selon l'effet qu'elles ont sur leurs victimes :

- Agents suffocants : chlore, phosgène, diphosgène et chloropicrine.
- Agents vésicants : yperite (gaz moutarde), yperite à l'azote, oxime de phosgène et lewisite.
- Agents hémotoxiques : cyanure d'hydrogène, chlorure de cyanogène, arsène.
- Agents neurotoxiques : tabun, sarin, soman, cyclosarin, VX.

A. Tableau récapitulatif

Agent	Type d'exposition	Dose létale(33)	Vitesse d'action	Mode d'action	Effets	Antidotes / traitements	Exemples communs
Agents suffocants	Inhalation	3 000-20 000 LC ₅₀	Retardée à rapide	Endommagent les voies respiratoires et provoquent une importante accumulation	Dyspnée; irritation des muqueuses; toux, serrement de poitrine Finissent par provoquer une accumulation de liquide	Aucun antidote Il faut porter un masque à gaz et des vêtements protecteurs pour éviter l'inhalation Traitement symptomatique	Désinfectant solvants, produits synthétiques

- prévention/traitement de l'œdème pulmonaire

Agents vésicants	Par contact de la peau ou par inhalation	Par exposition cutanée : 25-4 500 DL ₅₀ Par inhalation : 1 300-3 200 LC ₁₅₀	Rapide (apparition des symptômes retardée dans le cas de l'ypérite)	Provoquent des cloques sur la peau et endommagent les voies respiratoires, les muqueuses et les yeux	Érythèmes cutanés, endommagement des voies respiratoires, blépharite	Décontamination soignée à l'eau Prévention de l'infection par traitement aux antibiotiques Application de lotions et de pommades pour atténuer la démangeaison due aux érythèmes L'ypérite n'a pas d'antidote connu L'anti-lewisite britannique peut atténuer une partie des effets de la lewisite, bien que ce traitement puisse être toxique dans une certaine mesure	Papier et ca fabrication d pharmaceuti plastiques, c lubrifiants, c toilettes, cir
Agents hémotoxiques	Inhalation	2 000- 11 000 LC ₁₅₀	Rapide	Entravent le phénomène d'échange d'oxygène dans le sang	Perturbation de l'oxygénation des cellules; le cœur et le système nerveux central sont particulièrement susceptibles En outre, le chlorure de cyanogène irrite beaucoup les yeux et les poumons Dans les cas les plus modérés :	Les hémotoxiques sont particulièrement volatils; il faut laver les yeux à grande eau, retirer tout vêtement contaminé et rincer à l'eau toute partie de peau ayant été exposée Antidotes : administration intraveineuse de nitrite de sodium et de thiosulfate de sodium à des fins de détoxication Le R.-U. est en train de mettre au point un traitement préventif.	Pesticides, p produits d'é d'or et d'arg de pigments
						<ul style="list-style-type: none"> • vomissement • étourdissements • respiration difficile et accélérée 	
						<p>Dans les cas les plus graves :</p> <ul style="list-style-type: none"> • convulsions • arrêt respiratoire • perte soudaine de connaissance menant à la mort 	
Agents neurotoxiques	Contamination par la peau et/ou par inhalation	Exposition cutanée : 10-1 700 DL ₅₀ Inhalation : 50-400 LC ₁₅₀	Rapide à très rapide	Inhibent l'enzyme qui intervient dans le mécanisme de la transmission nerveuse au niveau des synapses	Effets perceptibles au niveau des yeux et des voies respiratoires Nausées et vomissements possibles Convulsions Arythmie cardiaque Perte de conscience et convulsions possibles dans la minute suivant une exposition à un agent fortement concentré Paralysie et décès à terme	La gestion de l'exposition aux agents neurotoxiques comporte quatre étapes : <ul style="list-style-type: none"> • décontamination • ventilation • administration d'antidotes • thérapie de soutien Médication possible : <ul style="list-style-type: none"> • Atropine et chlorure de pralidoxime • Diazepam (anticonvulsivant) Prétraitement possible : <ul style="list-style-type: none"> • Pyridostigmine (permet de reculer considérablement le seuil de dose létale à condition que le médicament soit ingéré avant l'exposition et qu'il soit associé au traitement thérapeutique traditionnel) 	Insecticides, détergents, c plastiques, t ignifugeants, peinture, cœr adoucissants pyrotechniq pharmaceuti pesticides

B. Agents suffocants

Les agents suffocants sont normalement dispersés sous la forme de gaz et inhalés par les victimes. Ils s'attaquent aux tissus pulmonaires et irritent les voies aériennes supérieures.

C. Agents vésicants

Les agents vésicants sont parmi les armes chimiques les plus répandues; ils comprennent les ypérites, la lewisite et l'oxime de phosgène. Les vésicants commencent par ensuite provoquer des lésions des yeux, des voies respiratoires et de la peau des victimes(39). Ils entraînent la formation de cloques sur toutes les parties du corps avec lesq c'est-à-dire surtout la peau, mais aussi les yeux, les muqueuses et les poumons. Inhalés, ils s'attaquent aux voies respiratoires; ingérés, ils peuvent entraîner vomissements et vésicants n'occasionnent qu'un faible pourcentage de décès, il n'est pas rare qu'ils provoquent la cécité et des lésions permanentes au système respiratoire. Les vésicants p forme liquide, d'aérosol, de vapeur ou de poudre(41).

Les ypérites sont caractérisées par une période latente exempte de symptômes qui se prolonge le plus souvent durant plusieurs heures selon la quantité d'agent, le mode d' ambiantes(42), ce qui fait que l'exposition peut d'abord passer inaperçue. En revanche, la lewisite et le phosgène agissent très rapidement et produisent presque immédiatement toux et des brûlures. À l'instar des ypérites, la lewisite provoque de sévères irritations des voies respiratoires, et les tissus nécrosés peuvent obstruer les voies aériennes de dernière développe une prédisposition à des infections secondaires à cause des lésions subies(43). Il existe peu de composés aussi douloureux et destructifs que l'oxir milligrammes seulement suffisent à occasionner de graves blessures, dont la guérison peut nécessiter jusqu'à trois mois(44).

D. Agents hématotoxiques

Dispersés sous la forme de gaz, les agents hématotoxiques pénètrent dans l'organisme par inhalation et sont ensuite acheminés dans tout le corps par la circulation sanguine. Il transfert des molécules d'oxygène par les cellules sanguines et, privant ainsi le corps d'oxygène, provoquent la suffocation de la victime(45). Les symptômes sont les suiva nausées, vomissements, étourdissements, maux de tête, confusion, faiblesse, somnolence, perte de conscience, sensation de brûlure, maux de gorge, dyspnée (essoufflement) et t

L'apparition des symptômes d'agression par un agent hématotoxique n'est pas nécessairement immédiate. Par exemple, l'exposition à l'arsine ou au chlorure de cyanogène lésions aux poumons, aux yeux et à la peau, mais ne pas se manifester avant plusieurs heures(47). L'arsine peut aussi entraîner un dysfonctionnement rénal, tandis que le endommager le système nerveux central et occasionner un dysfonctionnement des systèmes circulatoire et respiratoire de la victime(48). Il faut éviter le contact avec ce ge vêtements protecteurs et un masque qui protège le système respiratoire et les yeux.

E. Agents neurotoxiques

Les agents neurotoxiques peuvent être dispersés sous la forme de liquide, de vapeur, d'aérosol ou de poudre. En bloquant l'action de l'acétylcholinestérase (une enzyme impor système nerveux), ces agents perturbent le fonctionnement des muscles(49). Ils agissent très rapidement : une dose létale peut entraîner la mort dans les cinq minutes(50). habituellement du type d'exposition. Par exemple, en cas d'inhalation, les symptômes respiratoires apparaissent en premier; en cas d'ingestion, les premiers symptômes sont g

Les agents neurotoxiques connus sous le nom d'« agents G » – comme le tabun, le soman, le cyclosarin et le sarin – ont une persistance de quelques jours à peine après le « agents V » – dont le VX est le plus connu – persistent durant de longues périodes pouvant atteindre plusieurs mois par temps froid(52). Les symptômes sont les mêmes p: écoulement nasal, yeux embués, salivation et transpiration excessives, serrement de la poitrine, difficulté à respirer, troubles de la vision (contraction pupillaire intense), nausé miction et défécation involontaires, secousses musculaires et perte d'équilibre, maux de tête, confusion, somnolence, convulsions et coma(53). Pour se protéger contre ce ge porter des vêtements protecteurs et des masques respiratoires. Certains hôpitaux et services d'ambulance stockent des antidotes, mais comme les agents neurotoxiques aq antidotes ne sont efficaces que s'ils sont administrés immédiatement après l'exposition(54).

HISTOIRE DE LA GUERRE CHIMIQUE

On associe généralement l'utilisation de l'arme chimique aux progrès technologiques qui ont mené à la guerre moderne comme elle s'est manifestée au XX^e siècle. C'est l'armée a employé l'expression « guerre chimique » en 1917 pour décrire la guerre tactique où interviennent mélanges incendiaires, fumées ou gaz toxiques provoquant irritations, bn asphyxie. À la fin de la Première Guerre mondiale, la situation avait considérablement changé : l'arme chimique avait été utilisée largement et de nombreux pays cherchai convention visant à en restreindre l'usage et la mise au point. Cependant, le recours aux produits toxiques et à la maladie en temps de guerre, contre des civils et des s longtemps. Voici un récapitulatif des principales dates de l'histoire de la guerre chimique(55).

1000 av. J.-C.	Les Chinois utilisent des fumées d'arsenic.
600 av. J.-C.	Les Assyriens empoisonnent des puits ennemis à l'ergot de seigle et le magistrat athénien Solon utilise des racines d'hellébore (aux vertus purgatives) durant le siège de Krissa.
431-404 av. J.-C.	Durant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates auraient utilisé des fumées d'arsenic.
637	Les Grecs de Byzance utilisent un agent incendiaire appelé « feu grégeois » – mélange à base de pétrole, de poix, de soufre et de différentes résines – au cours du siège de Constantinople.
1675	Signature à Strasbourg, entre Français et Allemands, du premier accord international condamnant l'utilisation d'armes toxiques.
1774-1784	Découverte du chlore et détermination des propriétés et de la composition du cyanure d'hydrogène.
1802	Première synthèse du chlorure de cyanogène.
1812	Première synthèse du phosgène.
1822	Première synthèse du gaz moutarde ou ypérite.
1874	La Convention de Bruxelles sur les lois et les coutumes de la guerre impose l'interdiction générale des armes toxiques; elle interdit l'utilisation de poisons ou de gaz toxiques, ainsi que d'armes, de projectiles ou de substances susceptibles de causer des souffrances inutiles.
1886	Première synthèse de la chloropicrine.
1900	États-Unis adoptent, en premier, la mise au point d'armes chimiques lors de la première

Le terrorisme chimique (PRB 01-2...

été utilisées au cours de cette guerre, dont 90 p. 100 ont été dispersées par quelque 66 millions d'obus d'artillerie. L'utilisation des armes chimiques durant la Première Guerre mondiale causera des millions de victimes, dont plus de 90 000 morts.

- 1919** Signature du Traité de Versailles. Celui-ci comprend un article qui réaffirme les ententes précédentes relatives aux armes chimiques et interdit à l'Allemagne de fabriquer ou d'importer de telles armes de même que de se doter de moyens permettant de les produire.
- 1925** L'utilisation des armes chimiques durant la Première Guerre mondiale a conduit à l'adoption du Protocole de Genève, qui interdit l'utilisation d'armes biologiques ou chimiques en temps de guerre, mais n'interdit pas la recherche sur la production de tels agents. Le protocole est ratifié par presque tous les pays, à l'exception des États-Unis et du Japon.
- 1935** L'Italie utilise l'arme chimique en Éthiopie (l'Italie avait ratifié le Protocole de Genève en 1928). Il s'agit de la première infraction ouverte au Protocole.
- 1939** Le Japon utilise le gaz moutarde et la lewisite au cours de son invasion de la Chine.
- 1939-1945** Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne produit 78 000 tonnes d'agents de guerre chimique, notamment du tabun, du sarin et du phosgène. Au cours de la même période, le Japon en produit 8 000 tonnes et les États-Unis, 146 000 tonnes.
- Les années 1950** Militarisation du sarin par les États-Unis et mise au point d'un programme de développement de produits incapacitants.
- Les années 1950 et 1960** Mise au point et production d'une nouvelle génération de gaz neurotoxiques, connus sous le nom d'agents V. Ces substances sont plus persistantes que leurs prédécesseurs et sont près de 10 fois plus toxiques que le sarin.
- 1959-1975** Utilisation de défoliants et d'agents anti-émeute non létaux en grande quantité par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam.
- 1967** Utilisation ouverte d'agents de guerre chimique par les deux parties de la guerre des six jours qui oppose les Arabes à Israël.
- 1967** Les Égyptiens utilisent des agents neurotoxiques au cours de la guerre civile du Yémen (l'Égypte avait signé le Protocole de Genève).
- 1970** Le Japon signe le Protocole de Genève.
- Fin des années 1970** Des avions et des hélicoptères qui pulvérisent des aérosols de différentes couleurs attaquent le Laos et le Kampuchéa. On estime que plusieurs de ces nuages étaient composés de trichothécène (surtout de mycotoxine T2).
- 1978** À Londres, l'agresseur de Georgi Markov, un exilé bulgare, utilise un petit dispositif dissimulé dans la pointe d'un parapluie pour lui injecter une minuscule granule de ricin. La victime décédera quelques jours plus tard.
- Les années 1980** L'URSS utilise des agents chimiques de guerre en Afghanistan.
- 1980-1988** L'utilisation de l'arme chimique est très répandue durant la guerre Iran-Irak, surtout par l'Irak.
- 1991** Après la guerre du Golfe, le Conseil de sécurité des Nations Unies ordonne à l'Irak de cesser ses programmes d'armement biologique, chimique et nucléaire. La Commission spéciale des Nations unies sur l'Irak (CSNU) commence ses inspections au lendemain de la guerre.
- 1993** La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques) est adoptée à Paris. Jusqu'ici, 174 États l'ont signée et 143 l'ont ratifiée. La Convention est entrée en vigueur le 29 avril 1997.
- 1995** Des membres de la secte Aum Shinriky commettent un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant 12 passagers et en blessant plus de 5 000. À cause de la mauvaise qualité de l'agent utilisé et de l'inefficacité du système de diffusion, le nombre de victimes a été moindre que prévu. Plus tard, on découvrirait que le groupe a fait des expériences sur l'agent du charbon ainsi que sur d'autres agents biologiques.

- (4) William H. Barton, Recherche, développement et instruction dans le domaine de la défense chimique et biologique au ministère de la Défense canadiennes, Défense nationale Canada, 31 décembre 1988.
- (5) OIAC (1999), *A Brief History of Chemical Disarmament*.
- (6) OIAC, Fact Sheet 1: The Chemical Weapons Convention and the OIAC – How They Came About, 2000.
- (7) On trouvera le texte complet de la convention sur le site web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
- (8) OIAC (1997), *Chemical Warfare Agents*.
- (9) OIAC, Fact Sheet 4: What is a Chemical Weapon?, 2000.
- (10) Ron Purver, Le terrorisme chimique et biologique : la menace de terrorisme biologique ou chimique selon les sources publiées, SCRS, 1995.
- (11) *Ibid.*
- (12) John Pike, « Chemical Weapon Production », *Special Weapons Primer*, Federation of American Scientists, 1998.
- (13) Purver (1995).
- (14) *Ibid.*
- (15) Richard Charles Clark, *Technological Terrorism*, Devin-Adair, Old Greenwich (CT), 1980, cité par Purver (1995).
- (16) Défense nationale, Opérations des Forces canadiennes : doctrine de défense nucléaire biologique chimique pour les Forces canadiennes, B-GG-00:
- (17) Heather D. Durham (présidente), Colin R. McArthur et Kenneth L. Roy, Rapport annuel 2000 du Comité d'examen du programme de défense biologique septembre 2000, p. C-1.
- (18) *Ibid.*, p. 1.
- (19) Pike (1998), « Chemical Weapon Production ».
- (20) Elliott Hurwitz, « Terrorists and Chemical/Biological Weapons », *Naval War College Review*, 35:3 (mai-juin), 1982, p. 36-40, cité par Purver (1995).
- (21) Pike (1998), « Chemical Weapon Production ».
- (22) « The terror next time? », *The Economist*, 6 octobre 2001.
- (23) Purver (1995).
- (24) *Ibid.*
- (25) *Ibid.*
- (26) R.W. Mengel, « Terrorism and New Technologies of Destruction: An Overview of the Potential Risk », Annexe 2 dans *Disorders and Terrorism: Report of the Terrorism*, National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, Washington (D.C.), 1976, p. 443-473, cité par Purver (1995) [traduction].
- (27) John Pike, « Chemical Weapon Delivery », *Special Weapons Primer*, Federation of American Scientists, 1998.
- (28) Purver (1995).
- (29) *Ibid.*
- (30) *Ibid.*
- (31) *Ibid.*
- (32) « The terror next time? » (2001).
- (33) La dose létale médiane approximative d'un agent aéro-gène absorbé par inhalation est exprimée par la valeur LC₅₀ (milligrammes par minute par mètre cube ou mg-min/m³) concentration létal. La dose létale médiane approximative d'un agent toxique absorbé par la peau s'exprime par la valeur DL₅₀ (milligrammes d'agent par kilogramme de poids corporel). Plus le chiffre est faible, plus l'agent est mortel.
- (34) OIAC (2000), *Fact Sheet 4: What is a Chemical Weapon?*
- (35) John Pike, « Chemical Warfare Agents », *Special Weapons Primer*, Federation of American Scientists, 1998.
- (36) Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) et Commission de la communauté économique européenne (CCEE), Phosgène, International 1993.
- (37) Pike (1998), « Chemical Warfare Agents ».
- (38) PISSC et CCEE (1993), *Phosgene*, International Chemical Safety Cards.
- (39) OIAC (2000), *Fact Sheet 4: What is a Chemical Weapon?*
- (40) Pike (1998), « Chemical Warfare Agents ».
- (41) OIAC (2000), *Fact Sheet 4: What is a Chemical Weapon?*
- (42) Pike (1998), « Chemical Warfare Agents ».
- (43) *Ibid.*
- (44) *Ibid.*
- (45) OIAC (2000), *Fact Sheet 4: What is a Chemical Weapon?*

28/07/2009

Le terrorisme chimique (PRB 01-2...

(52) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), [Basic Facts about VX](#), Public Health Emergency Preparedness and Response.

(53) CDC :

- *Ibid.*
- [Basic Facts about Tabun](#) (GA).
- [Basic Facts about Soman](#) (GD).
- [GF: cyclohexyl sarin](#).
- [Basic Facts about Sarin](#) (GB).

(54) OIAC, [Nerve Agents](#), 1997.

(55) Sources consultées pour ce récapitulatif :

- [CBC News](#).
- [ABC News](#).
- U.S. Army Medicine, « [History of chemical warfare and current threat](#) ».
- Jeffrey K. Smart, « History of chemical and biological warfare: an American perspective », dans [Medical aspects of chemical and biological warfare](#), F.R. S Franz (dir.), Office of The Surgeon General, Department of the Army, United States of America, 1997, chapitre 2.
- OIAC (1999), *A Brief History of Chemical Disarmament*.

Dernière mise à jour : 2002-10-24

[Avis importants](#)

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090728111949-04'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090728111949-04'00')
/CreationDate
(Michel)
/Author
-mark-